







UPDATE VACUNES

2025

Realitzat per Lúdia Troya



A pink spiral-bound notebook with a white title box and a list of objectives. A large black arrow points from the left towards the title. Three black stars are in the bottom right corner.

Objectius


- Revisar les actualitzacions del calendari vacunal 2025
- Analitzar la situació epidemiològica actual del xarampió
- Analitzar la situació epidemiològica de la varicel·la
- Presentar recomanacions per a poblacions especials



Importància de la vacunació

- Eina preventiva d'alta efectivitat i acceptació
- Confereix immunitat individual i de grup
- Redueix significativament malalties prevenibles
- Relació cost-benefici favorable

Situació actual del Xarampió



Epidemiologia

- Alta contagiositat
- Brots recurrents en zones amb baixes cobertures
- Dades 2019: 57.000 casos a Ucraïna (50% casos Europeus)
- Disminució de cobertura vacunal en alguns països (del 96% al 45%)

Situació actual del Xarampió

Característiques Clíniques

- Període d'incubació: 10-12 dies
- Fase prodròmica: quadre catarral, febre moderada, conjuntivitis
- Fase exantèmica: febre alta, exantema maculopapular eritematós intens
- Complicacions: otitis, pneumònia, encefalitis

- Taques de Klopik(patognomòniques)



Situació actual de la Varicel·la

Epidemiologia

- Virus varicel·la-zòster
- Alta prevalença (95% en població adulta no vacunada)
- Risc de complicacions en adolescents, adults i immunodeprimits
- Possibilitat de reactivació com a herpes zòster

→ Situació actual de la Varicel·la

Característiques Clíniques


- Període d'incubació: 2-3 setmanes
- Exantema poliform amb lesions en diferents estadis evolutius
- Afectació principal: tronc i extremitats proximals
- Complicacions: sobreinfecció bacteriana, pneumònia, meningoencefalitis

- Exantema en “cel estrellat”



Calendari vacunal actualitzat

2025 Calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques




1. Immunització de tots els infants menors de 12 mesos, en la seva primera temporada epidèmica del VRS, de la següent manera: mascles i femelles amb anterioritat a l'inici de la temporada epidèmica del VRS (entre abril i setembre), durant el mes de setembre-octubre, i femelles i mascles durant la temporada epidèmica de VRS (octubre a març), preferentment abans de l'alta al naixement.
 2. Vacunació contra el rotavirus a partir dels 2 mesos d'edat següent la pauta segons la vacuna disponible.
 3. Contra el meningococ conjugada tetravalent (ACWY) s'ha de vacunar els adolescents d'11-12 anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de la vacuna ACWY a partir dels 10 anys d'edat. També s'ha de fer després fins als 18 anys d'edat, indicat.
 4. Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna contra la varicel·la (V) només s'han de vacunar als 11-12 anys els infants no immunitzats (no vacunats o sense antecedents de malaltia) o parcialment vacunats (de pautar vacunar contra de dues dosis).
 5. S'ha d'aproximar la vacuna dTpa a les embarassades, en cada embaràs, a partir de les 27 setmanes, preferentment entre les setmanes 27 i 32.
 6. S'ha d'administrar dues dosis de la vacuna contra l'herpes zòster a les persones que compleixin 65 anys o 80 anys.
 Nota: Es recomana la vacunació contra el SARS-CoV-2 cada any durant la campanya de tardor, segons les recomanacions vigents (persones majors de 60 anys i altres amb condicions de risc).

Per a més informació: **061** Salut Respon canalsalut.gencat.cat

Generalitat de Catalunya






Actualitzacions recents



**Pautes recomanades per
edat**

Vacunes Sistemàtiques


**Vacunes no
Sistemàtiques**



Actualitzacions i pautes



- XRP+VZ simultànea 3a
 - Rotavirus 2,4m o 2,4,6m
 - MACWY 12m
 - Bexsero 2,4, 12m
 - Pneumo 15
 - DTP 11a
 - VPH9 dosi única(també nens 2011)
 - Bexsero 2, 4, 12
 - VRS 0-6m
 - GRIP 6-59m
- 



Vacunes no Sistemáticas


MACWY



Vacuna Triple Vírica

Xarampié, rubèola, parotiditis

- Tipus: Vacuna atenuada
 - Pauta: 12 mesos i 3 anys
 - Eficàcia: 95% amb dues dosis
 - Consideracions especials:
 - No administrar abans dels 12 mesos(excepte situacions especials)
 - Útil profilaxi postexposició (primers 3 dies)
- 




Vacuna Varicel.la

- Tipus: Vacuna atenuada monovalent
 - Pauta: 15 mesos i 3 anys
 - Eficàcia: Propera al 100%
 - Consideracions especials:
 - Útil en profilaxi postexposició
 - En adults sense immunitat: 2 dosis (interval mínim 4 setmanes)
- 

Tractament de la varicel·la en pacients amb risc


- Edat 2-5 anys:
 - Aciclovir 80 mg/ml suspensió :
20 mg/kg/6h (5 dies) +
Loratadina 5 mg/24h(7 dies)
- Edat 6-14 anys:
 - Aciclovir 80 mg/ml suspensió:
20 mg/kg/6h (5 dies) +
Loratadina 10 mg/24h (7 dies)
- Pacients de risc:
 - Adolescents >12 anys, malalties
cròniques, tractament amb
corticoides, casos familiars
secundaris





Vacunació en poblacions especials- Migrants

- Prioritat: vacunes atenuades (XRP i Varicel.la)
- Menors de 7 anys: XRP, Varicel.la, Hexavalent
- Majors de 7 anys: XRP, Varicel.la, Td/dTpa
- Altres vacunes segons edat i risc



Vacunació en embarassades

- Grip: Recomanada en qualsevol moment de l'embaràs
- dTpa: una dosi en cada embaràs (setmanes 27-36)
- Beneficis demostrats per a mare i nadó
- Seguretat confirmada

→ **Contraindicacions i precaucions**

Contraindicacions generals



- Reacció anafilàctica prèvia
- Immunodepressió greu (vacunes vives)
- Embaràs (vacunes vives)


Al·lèrgia a l'ou

- Vacuna grip: sense precaucions especials
- Vacuna Triple Vírica: administració segura al centre de salut
- Reaccions greus: supervisió 30 minuts


Recursos per a professionals sanitaris



- Manual de vacunacions (pautes i intervals mínims)
- Calendari de vacunacions sistemàtiques
- Protocols i recomanacions específiques
- Guia per a la gestió de vacunes en centres sanitaris
- Enllaços web recomanats





CONCLUSIONS

- La vacunació: eina fonamental per a la prevenció
 - Xarampió i Varicel·la: malalties que requereixen vigilància contínua
 - Importància de mantenir altes cobertures vacunals
 - Necessitat d'adaptar calendaris a poblacions específiques
 - Formació contínua dels professionals sanitaris
- 





Referències



- Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica
- Actuacions per el cribatge clínic i epidemiològic a les persones migrants que arriben a Catalunya
- ProMIR/Resúmenes de Pediatría/Patología infecciosa
- Guia pediàtrica 266AD octubre 2024
- Calendari comú de vacunació aprovat pel Consell Internacional del SNS





MOLTES

GRÀCIES

ltroya.bcn.ics@gencat.cat